

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇效良方卷之三

五膽丸

治心風狂走癲癰

鯉魚膽

雞膽

狗膽

猪膽

羊膽

各一箇
外作一處

蛇黃

五兩
大膽汁
為度

右為末別以狗膽汁為丸如菰豆大硃砂為衣每服十五

丸食後以磨刀汁吞下或只作末以磨刀水調服亦可

抱膽丸

治男子婦人一切癲癰風狂或因驚恐怖畏所致

者及婦人產後血虛驚氣入心室女月脉通行驚恐蘊結

此方累曾經効本是忠懿王之子有疾忽得一僧授此服

之即効本名靈砂觀音丹忠懿得之未敢輕信或有一風

大飼以此藥立効破犬腹而視乃抱犬膽因易令名

水銀二兩

硃砂細研

黑鉛半兩

乳香一兩細研

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂滴乳聚

熱有柳木槌研勻丸如鷄頭大每服一丸空心并花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再服一丸可除根本

奪命散

壓風癰癩

用青礬石好者一兩為末同焰硝一兩拌勻入甘鍋內炭大煨通紅須化盡為度冷色如金取研為末每服一錢用薄荷自然汁入蜜調微溫服良久其藥自裹痰逐下隨大便夾和稠粘如膠乃藥之功

牛黃丸

治風邪變成癰癩時時發動不知人事定心神風

癰之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知蓋由血氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入於陰經故也又以胞胎之初其母卒大驚精氣并居能令子發癰其證與風癰大率相似

牛黃另研

真珠另研

琥珀另研

鐵粉另研

天竺黃

另研 龍齒 另研

麝香 另研

人參 去芦

龍膽草

去土 升麻

防風 去義

黃芩 去黑心

釣藤

犀角 鎔

水銀

丹砂 各半兩

金箔

七十片

銀箔

七十片

與水銀丹

露蜂房 炙

全蝎

酒炒各兩

知母

天門冬 去心

石菖蒲 米泔浸

白芍藥

茯神

麥門冬 去心 甘草

炙各一分

右除另研藥外餘藥搗羅為細末却入另研藥再羅令勻

煉蜜拌和得所更搗千杵丸如梧桐子大夜卧及食後煎

新竹葉湯下十五丸至二十九

治癰瘤發熱急狂走

右以鐵漿服之

鬱金丸

治癰狂可畏數年不愈多因驚憂得之乃瘳涎留

於心竅

蟬肚舊金

真蜀地來者七兩

明礬

三兩

右為末以薄糊丸如梧桐子大每服五十丸湯水任下初服覺心胃間有物脫去神氣酒然再服稍甦多服此藥大能去痰一方治癰以生薑汁糊為丸仍以生薑湯下

治諸顛風等疾

右用鯉魚一片製淨切成塊用明礬四兩為末醃一兩日煎喫其疾必愈

瓜蒂散

治風癲宜服此藥吐之

右用瓜蒂末一錢熱水調下吐痰如吐不止者以真麝香少許溫水服之一方名獨聖散治諸風隔實諸癰痰涎津液涌溢雜病亦然瓜蒂一兩右剉如麻豆大炒令黃色為細末每服量虛實久新或三錢藥末茶一錢酸蘆汁一盞調下若用以祛天氣精明陰晦無用如病卒暴者不拘於

此法吐時辰午巳前故內經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也論四時之氣仲景曰大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣寅卯辰候也故宜早不宜夜也先令病人隔夜不食服藥不吐再用熱漿水投之如吐風癰病者如全蝎半錢微炒如有蟲者加狗油五七點雄黃末一錢甚者加堯花末半錢立吐出蟲如濕腫滿者加赤小豆末一錢故此不可不用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑

治邪瀕狂大叫奔走

右用蝦蟆一枚大者去腸中滓令淨將腸胃却入腹中入瓶子中固濟以火燒通赤以土壘定隔日取出入麝香一錢同研令細每服一錢新汲水調下

守宮膏

治久年驚癇心血不足

守宮塢鱉珍珠

麝香

片腦研各一字

右將守宮一箇以鐵針定剪子取去四足連血細研入珍珠麝香片腦各一字許研細薄苛湯調作一服先須用奪命散逐下來涎或用吐法次服此藥大有神効蓋癇者皆心血不足此物可守宮其血與心之血類也取下如童女血服之於心故能補也心全則病瘥也

治癇疾

右用凌霄花末每服三錢空心用溫酒調下每服藥時鮮開頭髮用小梳不住手梳以冷水一大碗在側含水口中溫即換以一梳水盡則住梳如此法服四十九日永絕根本不以受勿淺深皆愈百無所忌

來麝膏

治遠年日近風癇心恙風狂中風涎沫潮閉牙關

不開破傷風搐並皆治之

右用皂角一斤好肥實無虫蛀者去皮弦切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬浸七日夏浸一二日揉取淨漿水浸透皂角汁入銀石器或砂鍋內以文武慢火熬用新柳條槐枝攪熬似膏藥取攤在夾紙上陰乾收頭如遇病人取手掌大一片用溫漿水化在盞內用竹筒兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入左右鼻孔中內良久扶起涎出為驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止忌鷄魚生硬濕麵等物

治痢疾

右用金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥令患者日中卧茶清調下仍且卧日中良久吐出鷄子大物永不發如不吐即以熱茶投之

大定心湯

治心虛中風驚悸恍惚多忘或夢寐驚魔志少

不足

人參

白茯苓

去皮茯神去木

遠志去心

龍骨

乾姜炮

當歸切焙

甘草炙

白朮

芍藥

桂心

紫苑去苗土

防風

赤石脂各一兩

右咬咀每服五錢七水二盞入棗二枚擘破煎至一盞去

滓溫服日三夜二

小定心湯

治心氣不足風邪所乘驚悸恍惚夢多魘

白茯苓

味酸官桂

去粗切甘草炙

芍藥

乾姜炮

遠志去心

人參各一兩

右咬咀每服五錢七水二盞棗二枚煎至一盞二分去滓

溫服日三夜一

秦光竹瀝湯

治風狂亂走

秦光去二兩

竹瀝一升

石膏三兩

白茯苓

龍齒各一兩半

玄參一兩

防風一兩

生鐵

二十斤用米二斗煮取一斗去鐵

右為散入鐵汁中煮取五升去滓內竹瀝和勻不拘時候

溫服二合

防已湯

治人風邪入肝脾二經言語不轉

漢防已

防風

桂心

附子

麻黃各半

威靈仙三分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝荆瀝地

黃汁各一盞生薑自然汁半盞和勻溫服之日三四

金箔十珍丸

治心神驚悸頭目不清

金箔五片

銀箔五片

丹砂錢兩與全

琥珀

別研

瑤瑁

珍珠

別研

犀角

蓬砂

別研

龍腦

別研

牛黃

別研

白茯苓

去皮

人參

紫河車

二兩

茯神

半兩

甘草

生一兩

右除別研藥外搗羅為末入別研藥和勻煉蜜和丸如鷄

頭實大每服一九嚼細用竹葉湯下食後臨卧服

茯神丸

治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽

喜忘朝嗟暮劇暮嗟朝發發則狂眩加茯神名茯神丸不

加茯神名定志丸

菖蒲

遠志

去心

茯神

各三

人參

三分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服六七十丸食後白

湯下日三亦得一方加茯神一兩半牛黃五銖為六物茯

苓遠志菖蒲

各一兩

忌酢物羊肉餒

茯神散

治諸風恍惚心神煩亂忘意不安或卧驚恐

茯神一兩

石膏研

龍齒各二兩

麥門冬去心一兩

黃耆一兩

甘草炙半兩

石菖蒲

人參去芦各一兩

防風三分

遠志半兩

熟乾地黄

羚羊角骨略一兩

右咬咀每服四錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎至

六分去滓不拘時候溫服

石菖蒲丸

治風虛安寢寐鎮心神止恍惚化痰滯

石菖蒲

遠志去心

鐵粉別研

丹砂別研各一兩

白茯苓

去皮人參各半兩

防風去芦

羚羊角分鎰各一兩

金箔

五十片三十片為夜

右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大以金箔為衣每服十

五丸至二十丸煎人參湯下早晚食後服

虎骨散

治白虎風走注疼痛發歇不定積年不効者

虎骨酥炙

烏梅肉

赤茯苓去皮肉接蓉酒浸

人參

甘草炙

芍藥

鱉甲

醋浸炙

白朮

巨鼓

慢火

紫苑

去土

黃耆

焙

常山

炒

枳殼

炙

犀角

鎊

知母

已上各

當歸

升麻

紫胡

桔梗

炒

前胡

去芦

桂心

去皮

木香

天靈蓋

酥炙各

桃仁

湯浸去皮尖

右為細末每服二錢七溫酒調下空心臨卧各一若為丸

即煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九溫酒下

沒藥散

治白虎風流注筋骨疼痛

沒藥

一兩

獨活

晚蚕沙

微炒

芫花

各一兩半

防風

去芦

蔓荊子

當歸

赤芍藥

桂心

略一

虎脛骨

二兩炙黃

右搗羅為細末每服二錢食前熱酒調下

海桐皮散

治白虎歷節走注骨節疼痛

獨活

車釐鹽水

川芎

當歸各一分

桃仁燍皮

天麻

辣桂

牛膝

麻黃去節

枳殼麸炒

海桐皮

白芍藥

川烏炮去

松節

防風

杜仲姜製

甘草炙各

麝香一分

虎脛骨炙黃

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎六分食前

溫服

攝風酒

治白虎歷節風及諸般風濕流注四肢大風鶴膝

一切風疾

尋風藤一兩

五加皮半兩

虎脛骨二錢

烏藥五錢

石楠葉

青木香錢各二

蒼朮五錢

骨碎補七錢

三角尖一兩五

威靈仙上生者

川續斷

當歸

滴乳香

川羌活

北細辛 各二錢半 青藤根 一兩

川牛膝 四錢

防風

甘草節

蘇木 各五錢

南木香 半錢

石薺 生者佳

生薑 一兩

川烏頭

一隻 分作四分 止 注用一分

右剉碎用無灰酒一罈將藥盛於布袋內放酒罈中油紙封縛以鍋內盛水將酒罈坐於鍋內慢火自辰煮至午連罈取出放今每日不拘時隨意溫服藥酒如夏恐停久作酸只作半料用小罈酒依上法煮服

治白虎歷節風痛者狀如虎咬骨節驚寒

白芥子

大戟

木鱉子

并遂

乳香

川烏

右各等分為細末水糊為丸如梧桐子大每服七八十九

酒下

烏蛇浸酒方
治風及白瘰紫瘰

烏蛇六兩酒浸去骨炙微黃
防風去芦
桂心

白蒺藜炒去刺
五加皮各二兩
熟乾地黄四兩

天麻
牛膝去苗
枳殼炒去穢黃
羌活各三兩

右剉細以生絹袋盛藥以無灰酒二斗於磁甕中浸密封
七日後開每日三度溫飲一小盞忌毒滑物猪雞肉

四神散
治紫白瘰風

雄黃
雌黃
硫黃
白礬龍用透者

右各等分研為末每用時先浴令通身汗出次以生姜蘸
藥擦患處良久以熱湯淋洗當日色淡五日除根

硫黃方

詩曰赤瘰白瘰兩般風
附子硫黃最有功

薑汁調勻茄蒂擦
一擦之後更無蹤

白癩用白茄蒂 紫癩用紫茄蒂

如用藥時先以布擦洗其瘡令損却以茄蒂蘸藥擦之

一方去附子加磨石專療白癩

一方用鷄子一枚醃醋浸過宿針刺小孔瀝取清液入砒霜一
棗豆許和勻將麤布痛擦患處以指點藥指之亦妙

一方治紫癩風再入胡粉一分膩粉少許同繫柳汁和勻臨卧
時搽三五遍並瘡

治白癩不拘遠近

用烏鷄卵一枚取清先用硫黃礬為末以鷄子清調勻用
生布一片將藥刷在布上日中曝反覆刷三四次釘布子
在板上令不皺候乾收起每遇浴罷或動作勞苦汗出之
時將布子於患處擦之即愈

治白癩風

詩曰紫癩白癩一般風 水銀輕粉最成功

搗取生薑自然汁 只消一擦便無蹤

治白癩風

右平且以手掠取韭頭露水塗之極効

鰻鱺魚塗方

治頭項及面上白駁浸淫漸長如癰狀但即

無瘡者

右用鰻鱺魚一頭肥者矣令脂出先洗白駁用物揩拭之
令小痛然後用熟魚脂塗之一度便愈甚者不過三度

鵝膝風

又名鵝膝風

治两大小腿瘦如蘆柴止有膝蓋大

者行履不得用小續命湯料內加草薢川練子獨活乾木
瓜咬咀不用生姜用水煎熬於枕底先放麝香少許去滓
入於枕內服之服至數十貼後加五積散同煎服永瘳
一方用紫荊皮老酒煎候溫常服

蒼耳散

治諸風

右於五月五日午時乾地刈取蒼耳葉洗曝燥搗下篩酒
若漿服一方寸七日三作散若吐逆可蜜和為丸每服十
丸準前計一方寸七數也風輕易治者日再服若身體有
風者皆作粟糠從肌膚出或如麻豆粒此為風毒出也可
以鍼鍼刺潰出之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾
貯大甕中稍取用之此草辟惡若欲看病省疾者便服之
令人無所畏若時氣不和舉家取之若病胃脹滿心悶發
熱即服之并殺三蟲腸辟能進食一周再服之佳七月七
九月九皆可採用一方用子炒令香搗去刺使破浸酒
服能去風補益一方取嫩葉一石切搗和五升麥蘖團作
塊放於高文中盛二十日狀成麴取米一斗炊作飯看外
煖入蒼耳麥蘖麴作三大升釀之封二十四日成熟取此

酒可兩重布不得金密則溢出又不可和馬肉食之空心
煖服酒妙

治風何首烏丸

王羊甫傳云其父禹玉平生服此有效

何首烏

西京者尤佳來一宿用竹刀割去皮切片焙乾得一斤

熟地黃

四兩焙

懷州牛膝

酒隔一宿焙乾四兩

右不得犯銅鐵器搗羅為末煉蜜為劑再入木臼內拌一
千下丸如梧桐子大每日空心溫酒下四五十九忌羊血
生葱蘿蔔藕不飲酒以飯飲下大有神効

療風

以丁公藤漬酒服

南史解叔謙鴈門人母有疾夜於

庭中稽顙祈告聞空中語云得丁公藤為酒即瘥訪醫及

本草皆無至宜都山中見一翁伐云是丁公藤能療風

乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈

魯王酒

治風眩心亂耳聾目指淚流鼻不聞香臭口爛生

瘡風瘡癰瘰癧下生瘡煩熱厥逆上氣胃脇肩脾痛手不能上頭不能解衣帶腰脊不能俯仰脚酸不仁難久立八風十二痺在緩六急半身不遂四肢偏枯筋挛不能屈伸賊風咽喉閉塞噎噎不利成如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久久不治入人五臟或在心下或在脊背行走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉皆治之

茵芋

烏頭

躑躅

天雄

防己

石斛

細辛

牛黃

甘草

預子仁

通草

桂心

秦朮

茵陳

山茱萸

去核

黃芩

切治作

附子

瞿麥

乾地黄

杜仲

澤瀉

石楠葉

防風

遠志去心

王不留行

胡洽作天門冬千金翼王鑑已上各十八餅

右咬咀以酒四斗漬十日每服一合加至四五合以知為

度千金翼名此為魯公酒有乾姜胡洽無防已以絹囊盛

藥用水二斗法麴二斤同漬三四宿出藥囊炊二斗黍米

內汁釀之酒熟飲如鷄子大日二服稍稍飲之以知為度

治風疾

取消梨不限多少絞汁而飲昔有一朝士見梁奉御診之

曰風疾已深請速歸去朝士復見鄆州馬醫趙鄂者後診

之言疾危與梁辨說同笑曰只有一法可試喫消梨不限

多少咀齧不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽矣亦

以梨葉作煎服

搜風大九寶飲

治挾氣中風痰雖微去當先服此順氣併

開其闕竅不致枯發然後進以風藥或非重熱氣實者亦可服之

沉香

防風

南星炮

天雄氣弱附子代

薄荷

地龍

去土

木香

不見火

全蠍

去毒各等分

右咬咀每服四錢水一盞生姜五片煎六分去滓入麝香

少許啜服不拘時

二香散

治風氣食三證通用調暢胃氣須兼服之

木香

藿香

白芷蕊

半夏麩

厚朴

姜製

陳皮

茯苓

蒼朮炒

甘草

炙各半兩

益智仁

縮砂仁

各一兩各一丁香二錢

右咬咀每服二錢半水一盞生姜三片棗二枚煎五分去

滓不拘時溫服

黃耆羌活飲

治心脾受病精血虛少風氣乘之日益削消

黃耆半一兩

羌活

石斛去根

防風

枳殼麩炒

人參

附子炮裂去

茯苓去皮

牛膝酒浸

五味子

牡蠣煅各一兩

續斷半兩

地骨皮三分

生地黄兩二

右劉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫

服日三服

人參湯

治風厥忘意不樂身背疼痛多驚善欠噫氣

人參

川芎

枳殼麩炒

芍藥

防風

細辛

附子炮裂去

甘草炙

桂心各半

桔梗炒

茯苓去皮

木香各一分

右咬咀每服五錢七水一盞半生薑半分煎至八分去滓

溫服

茯神湯

治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲

茯神

去木

獨活

各四

黃耆

遠志

去心

防風

各五

生薑

三兩

甘草

人參

當歸

牡蠣

煨

白朮

茯苓

附子

各二兩

右咬咀以潑水一斗二升煮取三升服五合一日夜盡

附子散

治風眩目痛耳聾

附子

炮裂去

乾姜

炮

防風

去義

山茱萸

去核

細辛

各一兩

山芋

一兩半

右為細末每服一錢七空心溫酒調下

六神散

治風眩煩悶頭目運轉不止

川芎

防風

去義

甘草

炙

羌活

各一

荆芥穗

雞蘇

各一兩半

右為細末每服一錢不拘時米飲調下

伏龍肝湯 治風邪卒不能言口噤手足不隨而強直者

右用伏龍肝末五升水人升和攪取汁飲之以盡為善

羚羊角散 治風邪筋脉緩弱言語蹇澀

羚羊角屑 桂心 茯神 麻黃去節根

葛根 附子炮裂去 當歸炒 酸棗仁

五加皮各一升 枳殼麸炒 獨活各一兩半

右咬咀每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去

滓不拘時服

四生散 治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明

多淚下症脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗者常多覺兩

耳中痒正宜服此無不取効

黃耆 羌活 沙苑蒺藜 白附子生用各

右為細末每服二錢用薄荷酒調下如腎臟風下症生瘡

以猪腰子批開以藥末二錢合定裹煨香熟空心細嚼以鹽酒送下

羌活飲子

治風毒上攻頭面發熱頰赤唇焦眼澁鼻出熱氣項背拘急兼治肝元盛風等疾

羌活

獨活

川芎

柴胡去苗

前胡

細辛

白蒺藜去刺

麥門冬去心

山藥

紫蘇葉

黃耆蜜炙

升麻已上各二錢半

烏梅去核

枳殼麸炒

防風

蔓荊子

桑本去土

荊芥穗

甘草炙

桑皮已上各半兩

乾葛

一兩

右以咀每服三錢水

盞半生姜三片薄荷五葉同煎至

八分去粗食後溫服

麻仁丸

順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液

耗少大便閉難或不通者年高氣弱及有風之人大便秘澁者宜服

枳殼麩炒

白檳榔原半 兔絲子酒浸 山藥

防風

山茱萸去核 肉桂去皮 車前子各一兩半

木香

羌活各一兩 郁李仁研去皮 大黃半生

麻仁研各四兩

右為細末入別研藥和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸溫水臨卧服之

搜風散

治風氣中脘不利大便閉

大黃剉半兩

郁李仁去皮兩 川芎一兩 枳殼麩炒一兩

麻子仁一分

檳榔一枚 木香一分 旋覆花

防風各一兩

青皮去白焙一分 牽牛取頭末二兩一兩

右為細末每服二錢七臨卧生薑茶調老小加減服

軍秘丸 一名大聖丸

治風熱大腸秘澁不通心煩腹滿體

熱引飲

檳榔

木香

川芎

羌活

桂心各二兩

大黃炭煨

郁李仁

煨各四兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九漿水下茶

湯亦得一方加枳殼二兩蜜丸一方加枳殼麻仁各四兩

各麻仁丸一方加甘菊訶梨勒生地黃山芋各二兩名如

聖丸一方治熱毒風用溫酒或生姜湯空心服

枳殼飲 治老人大便風秘不通塞澁妨悶或用蜜導之類

不能通者

右用枳殼水洗去穢麩炒為籠散每服一大錢入阿膠二

片生薑五片葱白五莖水一大盞煎至六分去滓入蜜少

許空心溫服次用葱白十莖爛研塗臍中却以手巾蘸葱

湯自內腎腰間浴熨至小腹下少頃氣透即通

通秘散

治風秘大便澀

香白芷火不煨多

右為細末每服二錢食前用蜜少許溫米飲調下連進二

服即通

漢防已散

治賊風身體拘急舌強言手足不遂

漢防已

黃芩各一兩

麻黃去根

石膏各一兩半

赤芍藥

川芎

防風

羌活

附子炮裂去

當歸炒各三錢

杏仁湯浸去尖炒

白朮各半兩

右咬咀每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去

滓不拘時溫服

倉公酒

治賊風口噤角弓反張

當歸

防風各三錢

獨活一兩半

麻黃一分兩

細辛 半兩 附子 一箇

右咬咀每服四錢水酒各半煎服口不開者扶開納藥一服甦二服少汗三服大汗愈

白花蛇煎 治蠱風身痛如刀割

白花蛇 烏蛇並用酒浸去皮 白蜜 三十

生薑汁 六兩 薄荷汁 六兩 白礬 炒 乾蝎 炒

苦參 各一 白附子 炮三

右為末先下蜜并生薑汁薄奇汁次下諸藥末拌和勻銀

器中重湯熬成煎以無灰酒調下半匙七久服身體滑膩

乳香犀角丸 治刺風遍身如針刺

乳香 研 犀角 鎔 自然銅 醋 附子 生去皮

沒藥 研 木香 蔓荊子 草烏 炮去

人參 丹砂 研 鐵沙 洗淨火出烟

香附各半

右為末并同研藥和勻用酒糊拌為丸如梧桐子大每服十五丸米飲下臨卧服

天麻散 治體虛廢理開為風邪所中遍身淫濯如鍼刺

天麻 白花蛇酒浸去皮骨炙 槐實子炒

羌活 防風去叉 蔓荊子 白鮮皮

晚蠶沙炒 枳殼麩炒 威靈仙去苗土 苧草炙各一兩

右為細末每服二錢七溫酒調下不拘時候

續肝丸 治四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒多長而

風癱為酒使痰注骨節四肢不能運動服此有效

茯神去心 白茯苓去皮 薑黃 白朮

黃耆 羌活 五加皮 川烏炮去

薏苡仁 木瓜 半夏曲 神麴

天椎炮去

白芍藥

乳香別研

沒藥別研

防風

獨活

當歸

玄胡索

桑寄生

海桐皮去粗

木香

陳皮去白

枳殼炒

南星炮

地龍去土

荆芥穗各五錢

麝香一錢

右用豬肝一具洗淨煮存性研爛同藥末酒糊為劑搗千
杵丸如梧桐子大每服三十丸用溫酒吞下如不欲酒用
木瓜湯送下

牡蠣白朮散

治風虛多汗少氣汗出如洗少者癢勞

牡蠣分三

白朮二分

防風去叉三

右為細末每服二錢七溫水調下不拘時服如惡風倍防
風少氣倍白朮汗多面腫倍牡蠣

姜糖飲

治勞風項強急痛四肢煩熱

菱荑 三兩

羚羊角 鎊

人參 各二兩

右搗篩每服半兩入豆豉三合葱白一握以水五盞煎取二盞去滓分溫空腹二服

附子湯

治房室忽中風惡風多汗汗出粘衣口乾上瀆不能勞事身體盡痛名曰內風

附子

生去皮

人參

各羊

芍藥

炒

茯苓

山藥

各一

甘草

炙

乾薑

炮各

右以咀每服四大錢水二鍾生薑三片鹽少許煎至七分去滓食前服之

牛黃天南星丸

治風熱相搏肌肉瞤動頭目眩眩筋脉拘急涎潮發搐精神昏昧舌強語澀肢節煩疼心胃不利凡

病風氣悉皆治之

天南星

以牛膽製者用二兩如無即用漿水煮透切片子焙乾

天麻

二兩

獨活

白附子炮

僵蚕炒

人參各一兩

當歸

先切

桑螵蛸炒

乾蝎炒

甘草生用各三分

桂心一分

羚羊角鎔

麝香別研

犀角鎔

牛黃

別研

雄黃別研

片腦別研各半兩

丹砂別研一兩

右先以十三味搗羅為細末再入別研五味和勻煉蜜為

丸如酸棗大每服一九不拘時細嚼溫酒下或鷄蘇湯下

苦參丸

治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

苦參

二兩

丹參去土

仙參去土

人參

五加皮

防風去叉

茯苓去

烏蛇用酒燉

蔓荊子

敗龜板炙

虎骨炙

玄參堅者各一兩

右為末用不銹皂角一斤剉碎以水三升浸取汁去滓於

無油鐵器內煎熬成膏用煉蜜四兩拌和為丸如梧桐子

大每服十五丸至二十九食後良久夜卧共三服各用荆

芥薄苛酒下

蒂散 治面及項或生白駁狀如白癰名曰癰瘍

故炊蒂 翫蒂 覆底 蛇蛻皮 一具

右以月蝕夜伺候正蝕時都燒成灰研令細每服不拘時
候以溫酒調服二錢仍以醋調藥如膏以塗傳臍上即消
治風熱毒氣客於皮膚遍身生瘡癰狀如麻豆方

秦艽 一兩 防風 黃芩 麻黃 去根

羣角膏 玄參 甘草 炙各 枳殼 麸炒

牛蒡子 黃耆 升麻 各三

右咬咀每服三錢以水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

垂柳湯浴方 治皮膚風熱生瘡瘡癰或痒痛

倒垂柳 剉 白礬 生用 杏仁 三兩

右咬咀以水一斗五升煎一斗去滓於無風處洗浴極妙

苦參散

治遍身風癢痒不可止

苦參

蒼耳苗

牡荊子

白蒺藜

炒去刺

玄參

胡麻子

晚蚕沙

蛇床子

天麻各一

晚蚕蛾

乳香各半

右為細末每服二錢不拘時候以紫筍茶湯調下

療癢體痛痒如蟲啣皮上痒時癢則皮脫作瘡

蒺藜子

三升

蛇床子

二升

荒蔚子

一升

防風

五兩

大戟

一斤

大黃

二兩

礬石

三兩

右以咀以酒四升水七升煮取四升去滓內礬石三上火

燒用帛拭身上瘰止一方無大黃

苦參丸

治肺風皮膚癢痒或生癰疹疥癬冠宗頭云有人

病遍身風熱細癢痒痛不可任者連背頸膺腹及近隱皆

然從痰亦多夜不得睡

苦參 一斤

皂莢

去皮并子 搗碎二斤 以水一斗 浸燥取漿十兩 去滓成膏

右搗苦參細末用皂莢膏和丸如梧桐子大每服三十

丸荆芥薄荷酒下一方無荆芥薄荷唯酒調下治遍身風

熱細疹痒痛亦可

卷柏散

治風皮膚癢疹及風熱毒瘡

卷柏

枳殼麩炒

羌活

五加皮

麻黃

去根節 各一兩

犀角屑

天竺黃

赤箭

藁本

桑耳

防風

川芎

黃耆

冬半 兩

烏蛇

酒浸去皮骨 炙黃二兩

右為細末每服二錢食前薄荷湯調下忌熱麪鷄猪魚蒜

秦丸

治諸風癢痒癰疹搔之愈甚

秦龜

防己

松指

陳皮者各 一兩半

枳殼

麩炒

茯苓

妙去角各 二兩半

川芎

苦參

白朮

防風去叉

附子

炮裂去皮

胡蘆

乾薑

一各

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每二十服九溫酒下漸加至三十九早晚食前各一服

鬼箭湯

治風癰累醫不効

鬼箭

白欬

白朮

一作白

礬石

煑令

枯

甘草

炙

防風

去叉

一兩

右咬咀每服五錢七水一盞半粟米粉二錢七同煎至七

分去滓食後溫服兼用粉粉身一方以溫水調藥服

蒼耳散

治風癰疹癢不止

右用蒼耳花子葉各等分為細末以黑豆炒微焦浸酒在

內未豆以酒調藥二錢不拘時候服此酒名豆淋酒

清肌散

治風寒暑濕外傳肌膚發為癰疹遍身癢痒或赤

或白口苦咽乾或作寒熱用敗毒散一兩半加天麻薄荷

各三錢蟬退二錢分作六服每服水一盞半生薑三片

煎溫服取効

五參散 治惡風

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

不通

蒺藜炒去刺

烏蛇酒浸去皮

乾蝎去上

天麻

赤箭

何首烏去皮

陳皮

去白

黃芩去心

原蚕蛾

一分

右並生用搗羅為細末每服三錢七熱茶湯調下服及半

料即減服二錢七初服三日後先覺頭項脊脊身上疼痛

乃藥力與病相繫也當安引兩後時許即無事如或身上

有瘡腫服藥一日後便漸減

硫黃酒

治惡風頭面肢體癰疹癰瘰

用透明蜂芒硫黃三錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲其清酒將滓又研細再入酒飲之連日如是硫黃能殺惡蟲自大便下

治諸破風腫及頭目面者宜服

人參

茯苓

甘草

前胡

芎藭

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

當歸

防風

荆芥

各等分

右咬咀每服五錢水一鍾半生薑一片煎一鍾不拘時服

急風一字散

治破傷風

雄黃

川烏

各二錢半

兩星

川芎

白芷

各半兩

全蝎

白附子

各半錢

辰砂

一錢

麝香

心許

右為細末每服半錢七溫酒調下忌熱物片時

太白散

治破傷風欲死者雖患入口已禁但心腹間緩者

嚥藥入口下咽喉即生

附子炮去

章烏炮去

天南星炮

藿香去土

人參

當歸各一

水銀一錢

錫一錢半與水

麝香一錢

右為細末每服半錢溫酒調下不拘時服惟忌冷水如飲

冷水再發不可治矣一方無錫

治破傷風將欲死者

川烏頭生

天南星生

半夏生

天麻去苦各

右剉碎每服一兩半以童男子小便二升半隔夜浸藥明

日煎取一大升空心溫服分為三服次服調攪搗末三錢

如人行十里更進一服如丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎

合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢物雞犬等仍忌油膩濕
麵生令硬物服至一二劑即吐出蟲子或泄瀉更不須服
餘藥若未吐利即當盡服病在上即止病在下即利皆出
蟲如馬尾人髮即瘥此藥能逐諸疾

守宮丸

治破傷風身如角弓反張及筋脉拘急口噤

守宮

七枚炙乾去足即蠍虎

膩粉

半錢

天南星

一兩酒浸三日曬乾

右搗研為細末以薄麵糊為丸如菉豆大每服幹開口以
酒灌下七丸有頃汗出得解更與一服再汗即瘥一方加
白附子一兩煉蜜為丸守宮一名辟宮子

又方治破傷風

用蝦蟆二兩半切爛為泥入花柳一兩同酒炒熟再入酒
二盞半溫熱去滓服之如重車行五里地通身汗出神効
治破傷風欲死者

用蜈蚣碾為細末擦牙吐出涎沫立瘥

白蠶蚕散

治破傷風身腫牙關不開

用白蠶蚕直者不拘多少生研為末每用生薑自然汁調以鷄翎於瘡口掃之勿令乾斯須腫塌皮皺為效仍用生薑汁調半錢七服一方治癰疹及大腸風秘以酒調服之一方治風痰生薑汁一茶腳濕水調灌之

羌活防風湯

治破傷風初得在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

地榆

細辛 各一錢

石分作二貼每貼水二盞煎至八分熱服若大便閉加大黃緩緩令過加黃芩

白朮防風湯

若服前藥有自汗者

白朮四錢

防風八錢

黃耆四錢

右分作二貼每貼水二盞煎至八分食後服

蜈蚣散

蜈蚣一對

魚鱉五分炒

左盤龍五分炒烟盡

右為細末用防風湯調服

太醫院經驗奇効良方大全卷之三

太醫院經驗奇効良方大全卷之四

寒門 附論

論曰夫中寒者寒為天地殺萬之氣人中之者其病速而危倉卒受邪生命暴絕蓋由胃氣大虛而又觸胃大寒胃虛則脾不能生旺而皮毛之氣先絕氣弱則表失衛護而寒邪易於外入使周身陽氣遏絕而不行四肢厥逆禁固而僵直故口禁目瞤而色青白或自汗表絕或下痢內脫內外俱虛而寒邪獨盛治失稍緩脉散而死岐伯曰冬三月此為閉藏水冰地圻無擾乎陽早卧晚起必待日光乃去寒就溫之意寒者天地為殺厲之氣在天為寒在地為水在人臟為腎而寒者中腎若中之者拘急孿痛昏不知人但言寒喜中腎者不言他臟中者且如辛苦之徒饑寒勞役不避風雪觸冒嚴寒之氣卒然病者以其五臟皆能有所中寒之證先頭痛身熱惡寒體病此是傷寒也當以

傷寒法內求之若卒然運倒憊然無所知覺而牙緊口禁與中風相類但脉弦緊或沉細者乃中寒也若素有血虛氣滯沉寒痼冷偏枯不仁拘攣之證與夫虛寒者虛謂陽不足寒謂陰有餘陽不足則五虛生焉陰有餘則寒氣積矣五虛既生則脉細弱氣少泄利不食乃其證也此證非比傷寒為病邪氣次序循經相傳表漸入裏熱雖甚不死夫人以腎為根本惟腎受寒傷腎氣一虛寒邪交併致生病焉大抵中寒脉必遲挾風脉必浮眩暈不仁兼濕則脉濡腫痛痲痺治療之法不可妄吐妄下則當補陽消陰暖丹田固真氣若嚴氏所論惟中寒時刻之間便有挾風兼濕脉證之轉展相乘者經曰以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣著人則傷五臟醫工救之不可妄慢緩急之勢明可見矣欲求捷効局方癸揮論前人治以附子理中湯其議此藥用得之矣蓋謂溫經則寒散而陽復補上則氣和

而表實氣充形完神無餒而不病矣

寒證通治方

不換金正氣散

解散寒邪

蒼朮

橘皮

半夏麴

厚朴薑製

藿香各二錢

甘草錢一

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎至一鍾食前服

人參養胃湯

治外感風邪內傷生冷

蒼朮

厚朴薑製

半夏湯洗七次

人參

茯苓

草菓

藿香各一錢

橘皮二錢

甘草錢半

右作一服水二鍾生薑七片烏梅半箇煎一鍾不拘時服

理中丸

治中寒腹痛

人參

白朮

乾薑炮

甘草各二兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服八十九米飲湯送下
食前服一方加炮過附子一兩

生料五積散

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐

肚腹疼痛外感風寒及寒濕客於經絡腰脚酸疼並皆治之

白芷 七分

陳皮 一錢

厚朴 薑製 八分

桔梗 九分

枳殼

去穢炒 八分

甘草 炙 六分

茯苓 八分

蒼朮

米泔浸 二錢

麻黃 一錢

肉桂 六分

芍藥

八分

乾薑 炮 八分

半夏 湯洗 七分

右作一服水二鍾生薑三片葱白三莖煎一鍾不拘時服

理中湯

治五臟中寒口禁失音四肢強直兼治胃脘停痰

冷氣刺痛

人參

乾薑 炮

甘草 炙

白朮 各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

薑附湯

治中寒四肢厥冷強直失音口噤吐沫

附子

炮三

乾薑

炮五

右作一服水二鍾煎至八分不拘時服

薑桂散

溫中散寒

乾薑

良薑

各一

辣桂

木香

半夏麴

甘草

炙各

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎一鍾不拘時服

附子理中湯

治中寒中濕嘔逆虛弱

人參

白朮

乾薑

附子

炮去皮

甘草

炙一

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服如血少加

當歸一錢同煎服

沉附湯

治霍寒無陽胃弱乾嘔

附子

炮去皮

乾薑

炮各二

沉香

白朮

各一分

甘草

炙八分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

沉香桂附丸

治中寒心腹冷痛霍乱轉筋等證

沉香

附子

炮去

乾薑

炮

良薑

炒

官桂

去皮

茴香

炒

川烏頭

炮去皮臍對作小塊子如豆大

吳茱萸

湯浸洗炒

右各一兩為細末用好醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服五七十九熱米飲送下空腹食前日進二服忌生冷硬物

熨法

治三陰中寒一切虛冷厥逆嘔噦陰盛陽虛之證及

陰毒傷寒四肢厥冷臍腹高咽喉疼嘔吐下利身背強自汗脉沉細唇青面黑諸虛冷證皆宜用之

肥葱

切

麥麩

各三

滄鹽

二

右三件入水一大盞同和拌勻濕分作二次於錦鍋內同炒極熱用重絹縫作二包將一包熱熨臍上冷更易一包葱包既冷再用鹽水拌濕炒焦依前用之至煤爛不用別取葱熨日夜不住相續至身體溫熱脉壯陽氣復來而守正氣養之和之

又方 治陰證傷寒腹痛吐利唇青面黑身背強四肢冷脉沉細咽喉不利

右用滄鹽一斤炒焦大熱布絹二重作囊包裹盛之熨陰臍間亦同葱熨法尤妙

溫中降氣丸 治中寒氣痞脾胃不和飲食進退臍腹虛冷

及中酒吐逆胃膈不利

附子

去皮脐切作片藥大杆一尺用生薑自然汁半升浸石器內慢火煮薑汁盡為度薄切焙

乾生薑

二片 白朮

人參

陳皮

去白

神麴炒黃

半夏湯洗

白附子炮

當歸洗焙

天南星炮

高良薑煨切

丁香

木香

沉香

胡椒

肉桂去粗皮

右為細末用生薑自然汁煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯下不拘時服

附子散 治陰證傷寒唇青面黑身背強痛四肢厥冷及諸

虛沉寒

附子炮

官桂

當歸

白木各二

乾薑炮

半夏炮各二

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾食前服

太醫院經驗奇効良方大全卷之四

太醫院經效良方大全卷之五

暑門

附論

夏三月炎暑大行山澤煇燎林木流津正由火熱極甚薰蒸於物致之然也在人亦應之而多汗由火氣浮泄於表時於此際濕熱陰盛人多肢體困倦精神短少一或將理失宜輕則氣虛身熱頭重脚軟脾弱少食之證所謂注夏病也暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心且暑之中人者先着於心伏為三焦腸胃之間凡中之者蓋熱傷氣而不傷形也乃六淫中無形之火大率以五行中有形之水制之輕則前證所感大同小異重則昏不知人或吐或瀉或眩暈頑痺丹溪以陰虛所致甚則腎悶懊懣而死客氣旺而主氣弱為熱傷元氣古人立法夏月宜補者補天真元氣非補熱火也以用人參五味子麥門冬名生脉散蓋此藥能益金水以禦火土之旺又令人夏食寒以扶

陰氣養其陽也蓋謂陽亢於外陰微於內庚金受囚於上清肅之源竭於下也丹溪又辯云世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷者其悞甚矣或曰以手捫腹明知其冷而何曰人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中之陽虛矣如子月一陽生寅月三陽生此氣之升也已月六陽生陽盡出於地之上矣此氣之浮也經曰夏者經滿氣溢入孫絡受血皮膚充實長夏孫絡皆盛內溢肌中又曰陽氣在孫絡長夏氣在肌肉所以表實者裏必虛又言春夏養陽王太僕謂春食涼夏食寒所以養陽也何以溫熱取其用此理固然且如涼薑水館薑風取涼寒泉水菓之物所傷或吐或瀉或腹疼自內及外當用溫劑前哲又謂升降浮沉則順寒熱溫涼則逆夏月火令之時不可妄投溫燥之藥者其虛實不為患乎或曰巳月純陽五月一陰生六月二陰生陰氣既動豈無陰冷此陰之初動於地下

四陽浮於上燔灼炎流全燦石何冷之有且繁古治中暑之
藥有中者傷暑之分若人或傷或中之意但言避暑納涼於深
堂大廈請靜而得之爲中暑其病必頭疼惡寒身形拘急肢節
疼痛而煩心肌膚大熱無汗爲房室之陰寒所遏使周身陽氣
不得伸越爲陰證故治以大順散以取辛甘發散之意後人不
察用溫熱之意又辨傷暑之證若人或農夫於日中勞役謂動
而得之爲傷暑其病必頭疼發躁熱捫之肌膚大滿大熱大渴
引飲汗大出無氣已動乃爲大熱外傷肺氣以人參白虎湯爲
陽證熱傷元氣非斡體受病也夫白虎治熱傷氣謂元氣不甚
虛也暑去氣清則安矣脾胃論中長夏濕熱胃困尤甚又有暑
風一證因其夏月而病擣弱故有此名非風也乃病暑熱亢極
火盛金衰木無以制正邪相拒汗閉於外痰鬱於內風勢妄行
脾必受邪故手足陽爲動搖內擾神舍志識不清而腎悶無所

知矣慎勿以風藥治之治以兼化但清時令之火則心經之熱亦泄金清氣行則木邪有制而風不作開鬱悶之疾則神識氣寧當用黃連香薷飲加羌活且如有人在途路中傷暑者湯藥皆無將人撓扶涼處就將當道土熱上包裹熨臍腹之上下或布蘸湯熨之冷即頻易待其甦醒用溫米飲湯徐徐灌之便不可用剛燥之劑可不畏哉

五物香薷湯

驅暑和中通用

香薷

四錢

白扁豆

厚朴

薑製各一錢

白茯苓

一錢

甘草

炙

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

香薷縮脾飲

驅暑和中除寒止渴

香薷

三錢

縮砂

二錢

草薢仁

乾薑

各一錢

烏梅肉

白扁豆

甘草

炙

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

冷香飲子

治老人瘧人伏暑煩躁引飲無度惡心疲倦服

服涼藥不得者

草薢仁

五升附子

橘紅

甘草

炙各一升

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾去粗沉冷旋旋服不拘時候

香薷劉散

解暑毒止霍亂

香薷

厚朴

薑製各二升

茯苓

一升

甘草

半升

陳皮

良薑

各一升

右作一服水二鍾入鹽些少煎至一鍾不拘時服

二氣丹

治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心並

皆治之

硝石

硫黃

各等分

右為末銀器內文武火炒令鵝黃色再礱細用糯米煮糊為丸如梧桐子大每服四十九新汲水送下不拘時服

五苓散

治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤色心神

恍惚一方加辰砂各辰砂五苓散

澤瀉二各半

肉桂一兩

赤茯苓

白朮

猪苓二各半

右為細末每服二錢白湯調下不拘時服

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉

去毛

厚朴

薑製

陳皮

丁香

各半兩

白茅根

麥門冬

去心乾木瓜

甘草

各一兩

香薷

七各半

右為細末每服二錢生薑湯或冷水調下不拘時服

消暑丸

治伏暑引飲脾胃不和

半夏醋炙

甘草生用

茯苓去水各半斤

右為細末用生薑汁煮麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸熱湯下不拘時服

桂苓甘露飲

治伏暑引飲過勞肚腹膨脹霍亂吐瀉皆治

肉桂半兩

白茯苓去支

猪苓

滑石二兩各

寒水石煨

甘草炙

澤瀉各一兩

右為細末每服三錢入蜜些少熱湯冷水任調下

解暑三白散

治胃暑伏熱霍亂吐瀉小便不利頭目昏眩

白茯苓

白朮各五

右作一服水二鍾生薑五片燈心十莖煎一鍾不拘時服

十味香薷散

消暑氣和脾胃

香薷

人參

陳皮

白朮

黃耆

白扁豆

甘草炙

厚朴

木瓜

茯苓去皮各半兩

右為細末每服二錢熱湯冷水任調下不拘時服

香朴飲子

治大人小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂

人參去蘆

茯苓去皮

甘草炙

紫蘇

澤瀉

香薷

半夏麴

白扁豆

烏梅肉

木瓜

厚朴薑製各一兩

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾食前服

六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱

交作痰喘咳嗽胃脘痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜卧倦怠

小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中

酒煩渴畏食並皆治之

縮砂

半夏湯洗七次

杏仁去皮

人參去蘆

赤茯苓

去皮藿香去土

白扁豆

薑剉香薷

厚朴薑製

木瓜各一

甘草炙半

右作一服水二碗生薑五片紅棗一箇煎一鍾不拘時服

聖惠方

治絞腸痧痛不可忍長轉在地或起或仆其腸絞

結在腹此是中毒之深須更令人死

右用鹽一兩熱湯調灌病人口中鹽氣到腹其痛即定

竹葉石膏湯

治伏暑內外熱熾煩躁大渴

石膏半兩

麥門冬去心

人參去蘆各

甘草炙半

半夏

湯洗七次

右作一服水二鍾生薑五片青竹葉十四片粳米一撮煎

至一鍾不拘時服

黃連香薷湯

治伏暑傷冷霍亂轉筋心腹脹痛四肢厥冷

香薷三升

厚朴薑製

黃連各一

右先將厚朴黃連二味同生薑四錢一處搗細於銀石器

內慢火同炒令紫色取起入香藥入水一盞酒一盞煎八分去粗用磁器盛於新汲水中沉令極冷服如中暑搐搦內加羌活二錢尋常感暑燥渴吐瀉不甚重者方中可去黃連只加白扁豆二錢微炒剉煎如前法服之如炒黃藥莫北銅錢器

辰砂益原散

治伏暑煩渴引飲小便不利心神恍惚

辰砂 三錢

滑石 六兩

甘草 一兩

右為細末每服三錢不拘時白沸湯調下

冷香湯

治伏暑引飲躁渴過食生冷成霍亂

良薑

附子

炮去

甘草 炙

檀香 各二

乾薑 一

丁香 三分

草菓 一

右咬咀作二貼用水二鍾煎至一鍾去滓貯瓶中沉井中

待冷服之

御愛薑蘇丸

治中暑惡心頭疼煩燥生津止渴

紫蘇葉

煉淨

烏梅肉

切炒

甘草

生

二兩

桂心

去

半兩

皮

香薷

煉淨

生薑

切焙

木瓜

乾者

二兩

如生

皮

半兩

煎

水

送下

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一九細嚼熟水送下

黃順散

治中暑煩渴

甘草

半兩

肉桂

去

半兩

乾薑

半兩

紫蘇葉

半兩

煎

水

送下

烏梅肉

兩半

乾

一

煎

水

送下

一

煎

水

送下

一

煎

水

送下

一

煎

水

送下

右為細末每服二錢冷水調下沸湯調服亦得

龍鬚散

一名甘草漿

治

胃

暑

伏

熱

心

膈

燥

悶

飲

水

過

度

不

知

一

煎

水

送下

一

人事及霍亂吐泄作渴衄血吐血小便下血頭旋目暈

五倍子

一作五味

子

二兩

烏梅

去

仁

甘草

多

一

煎

水

送下

一

煎

水

送下

一

煎

水

飛羅麵

二兩

一

方

用

清

白礬

枯

一

兩

用

一

煎

水

送下

一

煎

水

送下

一

右為細末每服二大錢新汲水調下一服即愈即解諸毒

物雖平日不飲冷者服之亦有奇効一方加訶子肉滴水
為丸謂之龍涎丸仍似末調下翟公巽叅政易名濯熱飲
子為丸彈子大陰乾細嚼水送下

地仙散

治傷寒後伏暑煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮

去木二兩

防風

去蘆一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓食遠溫服

治中暑不拘老少

右用不蛀皂角不計多少刮去黑皮燒煙欲盡用盆合於
地上周回勿令透煙每用皂角灰一兩用甘草末六錢和
勻每服一錢新汲水調下氣虛人溫漿水調下昏迷不省
者不過兩服長內翰備急用皂角五片去皮弦炙焦存性
甘草玉兩蓋中暑人痰塞開竅皂角能疎利去痰故也一
方用米飲下

治中暑甚妙

右用上等重羅細麵以薑汁及水和成餅子曝乾却碾末收之每服二三錢新汲水調服

香薷丸 治大人小兒傷暑伏熱燥渴脅悶頭目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷

去根一兩

紫蘇

去穢一兩

乾木瓜

藿香

洗去沙土

茯神

六木各五斤

甘草

炙赤色

檀香

剉一

丁香

各二斤半

右為細末煉蜜和丸每兩作二十九丸每服一丸至二丸細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒每服半丸不拘時候水瓢丸 治胃暑毒解煩渴

烏梅肉

四兩

甘草

青鹽

各二兩

乾木瓜

白茯苓

檀香

各一兩

麝香

二斤半

右除麝香別碾餘並為細末煉蜜為丸每兩作三十九每服一丸含化或新汲水溫水嚥下不拘時候一方有人參水胡蘆丸 治證同前

川百藥煎三人參二升

麥門冬

烏梅肉

白梅肉

乾葛

甘草各半

右為細末麵糊為丸如雞頭大每服一丸含化夏月出行一丸可度一日

發火散

治傷暑煩燥發渴口苦舌乾頭痛惡心不思飲食

昏迷不省人事欲死者及治血痢婦人熱血崩

青皮去白

赤芍藥

黃連去鹽

地榆各等

右為細末每服三錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行加甘草等分一方漿水調服治血痢水一盞煎服

通草散

治伏暑下血如久痢崇寧二年自太府出為發運夏

及秋患痢兩月一日一夜三四十次然血多白少各醫皆
曰此痢也聞泗州青陽鎮李中和助教善醫即遣人召之
中和至看脉即曰此非痢也殆甚怒之徐叩之李曰血多
白少小便澀少即非痢其言中余之病心已神之乃是舊
因伏暑小便轉導入大腑由心經而過遂化為血大小便
下故其狀似痢而非痢也但令大小便各歸本藏即安
通草各半 水通各半 澤瀉一分 竹茹二升少用
右剉如大米粒或為細末就剉時即每服秤三錢水一盞
煎至七分溫服細末即每服抄二錢依前法煎食後并夜
卧各一服便住信知天下有如此妙醫余家數婢久痢服
之皆安故記傳久

異功敵暑丸

治伏暑或吐或瀉有効

黃連

一斤

陳倉米

二升水二

右於鍋內如粳飯法米熟為度曬乾為末以水為丸如梧
桐子大每服三五丸飯湯下不以時

檀香丸 解毒

檀香一升 杏仁去皮半 烏梅肉二升 紫蘇葉一升

茴香三升 百藥煎二升 甘草半升

右為細末煉蜜為丸如彈子大非時含化

白梅湯 治中熱五心煩燥霍亂嘔吐口乾煩渴津液不通

白梅九升 檀香三升 甘草四升 鹽五升

右為細末每服二錢入生薑五片青竹葉七片粳米百粒

水煎服

五聖湯 治暑病嘔惡每遇夏月不進飲食疲倦少力見日色

則頭目昏痛惡心多睡

貫衆 黃連去腐 甘草炙 吳茱萸湯洗

白茯苓 去皮

已上五味並生用各半兩右咬咀平分三服每服用水一
椀半煎至一椀去滓放冷候日午時先取香熟甜瓜一枚
切去皮作十二片先嚼瓜一片呷藥一二呷送下了再如
前嚼瓜一片呷藥一二呷看喫得幾片以藥汁盡為度不
損脾胃不動臟腑須是覺大煩時服之

蠟梅丸 止渴生津

蠟梅花末 乾薑末 甘草末

枇杷葉末

百藥煎末 烏梅肉末 已上各一兩

蠟五兩

右先熔蠟開投蜜一兩和上件藥末搗二三百下丸如鷄
頭實大夏月長途一日含化一九妙

治中暑迷悶欲死

右取蒜一瓣生嚼以新水送下或不能嚼水研灌之立可

効熱死人切勿便與冷水及卧冷地正如凍死人須先與冷水若遷近火即死一法行路暈死人惟得置日中或令近火以熱湯灌之即活一方以爛蒜嚼三兩辦溫水送下治時暫伏暑

右用香附子春中搗去皮入薑汁炒香為末入砂糖九龍眼大先呷麻油少許次嚼藥冷水送下當時便覺清涼春澤湯 治伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽不分疑二之間最宜服此

澤瀉 三升

猪苓 一升

茯苓 二升

白朮 二升

桂心 一升

人參 半升

柴胡 一升

麥門冬 一升

渴甚去桂加五味子黃連各二錢

石炭咀每服七錢水一鍾半燈心二十根煎一鍾食遠服
不醫院經驗奇効良方大全卷之五